INFORMATION FOR THE USER

Gyno-Mikozal

Vaginal Cream 2 % **20mg**
Antifungal Agent **Miconazole nitrate**

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.
- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

What is in this leaflet:

1. What **Gyno-Mikozal** is and what it is used for
2. What you need to know before you use **Gyno-Mikozal**
3. How to use **Gyno-Mikozal**
4. Possible side effects
5. How to store **Gyno-Mikozal**
6. Further information

1. What Gyno-Mikozal is and what it is used for

The name of your medicine is **Gyno-Mikozal** cream.
Gyno-Mikozal cream is for use in adults.
Gyno-Mikozal cream contains a medicine called miconazole nitrate. This belongs to a group of medicines called 'antifungals'.
Gyno-Mikozal cream is used for infections of the vagina and the skin around the vagina. Signs of these infections include itching, redness and white discharge.
Gyno-Mikozal cream works by destroying the fungus that causes the infection and some of the bacteria which may also be present.
Your sexual partner may also need to be treated. Ask your doctor for advice.
About vaginal thrush
Vaginal thrush is a very common problem affecting women of all ages. It has nothing to do with poor hygiene. It is often caused by a fungus (Candida albicans) that is present in everybody. The fungus is normally kept in check by the body's defences.
Sometimes the fungus can become a problem due to:
- Recent use of antibiotics
- Pregnancy
- Use of oral contraceptives
- Wearing tight clothing
- Over use of hot baths and bath additives

You can prevent infections coming back by:
- Washing the infected area in the morning and evening with plain, warm water. It is important that you dry thoroughly
- Wiping backwards (away from the vagina) after visiting the toilet
- Not using medicated and perfumed bath additives
- Not wearing tight clothing

2. What you need to know before you use Gyno-Mikozal

Do not use Gyno-Mikozal cream if:
- You are allergic to anything in the cream (listed in section no. 6 below)

Do not use this medicine if this applies to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before using **Gyno-Mikozal** cream.
Warnings and Precautions
Check with your doctor or pharmacist before using this medicine:
- If you are using a 'barrier' method of contraception. This includes condoms or diaphragms. This is because **Gyno-Mikozal** cream can damage the rubber and stop them working properly. Talk to your doctor about using another type of contraception while you are using this medicine.
- Do not allow other people to use your flannel or towel. This will stop them from getting your infection.

Children and adolescents
Gyno-Mikozal cream is not recommended for use in children or adolescents under the age of 18 years.
Taking other medicines
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines. This includes medicines that you buy without a prescription or herbal medicines.
In particular tell your doctor if you are taking:
- Medicines to thin the blood (anticoagulants) such as warfarin. Your doctor will need to check that the anticoagulant is working properly
- Medicines for diabetes, taken by mouth
- Medicines that act on the heart and blood vessels called 'calcium channel blockers' such as dihydropyridines and verapamil
- Medicine for epilepsy called phenytoin
- Medicines to lower cholesterol called lovastatin or simvastatin

Tell your doctor before taking, or if you are already taking any of the above. They may need to alter your treatment.
Pregnancy and breast-feeding
Please tell your doctor before using **Gyno-Mikozal** cream if you are pregnant, think you may be pregnant or might become pregnant.
You may still be able to use **Gyno-Mikozal** cream if your doctor thinks you need to.
Talk to your doctor before using this medicine if you are breast-feeding.
Ask your doctor or pharmacist for advice before using any medicine if you are pregnant or breast-feeding.
Important information about some of the ingredients of Gyno-Mikozal cream
- The cream contains benzoic and butylated hydroxyanisole. These can irritate your skin, eyes, eyelids, mouth and nostrils if they come into contact with them

3. How to use Gyno-Mikozal

Always use this medicine exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
Using the cream
- Each tube of **Gyno-Mikozal** cream is sealed. You will need to use the cap to pierce the seal.
- Do not swallow the cream

For infections of the vagina
Your doctor may suggest treatment over 7 to 14 days:
- **7 day course -** insert the cream into the vagina twice each day for 7 days
- **10 to 14 day course -** insert the cream into the vagina once each day for 10 to 14 days

Your doctor will tell you how much cream to use and for how long you should use it.
For infections outside the vagina
- Apply the cream to the affected area twice each a day
- Lightly cover the skin around your vagina with a thin, even layer of cream
- Always wash your hands with soap and water after using the cream

Your doctor will tell you how often and for how long to use the cream.
When to stop using Gyno-Mikozal cream
Keep using the cream until the course is finished, even during your period. Do this, even if the redness, itching and discharge go away before the end of the course.
Directions for use
- Wash your hands.
- Remove the cap from the tube containing the drug and pierce the seal of the tube by means of the pin on the top of the cap.
- Screw the applicator to the tube.
- Squeeze the tube until the applicator is filled or the required amount prescribed by the physician is in the applicator.
- Remove the applicator from the tube and close the tube instantly with care.
- Lie on your back, draw your knees up and spread them apart.
- Gently insert the applicator into the vagina as deeply as possible and hold the cylinder and with the other hand push the plunger down thus inserting the drug into the vagina.
- Withdraw the applicator from the vagina.

Directions for cleansing the applicator
- Clean the applicator by pulling the two parts apart, wash them with soap and warm water, rinse, and dry.
- Rejoin the two parts after drying and keep the applicator in a clean case.
- Sterilisation of the applicator should be done if it is recommended by the treating doctor. Never use water that is hotter than 50°C and never use ether.

If you swallow Gyno-Mikozal cream
If a large amount of cream is eaten or swallowed talk to a doctor or go to the nearest hospital casualty department straight away.
If you forget a dose
- Don't worry, apply the next dose of cream as usual and keep using the cream as your doctor has told you
- Do not use a double dose of cream to make up for a missed dose

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, **Gyno-Mikozal** cream can cause side effects, although not everybody gets them.
Stop using Gyno-Mikozal cream and tell your doctor straight away if you notice the following. You may need medical treatment.
- Severe irritation or reddening of the skin, swelling of the face, lips, tongue or throat, light headedness, wheezing or difficulty breathing or other signs of allergy during the first few days of treatment. This only happens in a small number of people

Other side effects:
- Local irritation (around or inside the vagina), itching or burning sensation of the treated area. This is much milder than an allergic reaction. Tell your doctor or pharmacist if these feelings continue
- Skin rash or hives (also known as nettle rash or urticaria)
- Stomach pain
- Low stomach pains (pelvic cramps)
- Headache
- Infection of urine or pain in passing urine
- Vaginal bleeding
- Feeling sick (nausea)
- Redness of the face

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

To report any side effect(s):
The National Pharmacovigilance and Drug Safety Center (NPC)
Fax: +966-11-205-7662
Call NPC at +966-11-2038222,
Exts: 2317-2356-2353-2354-2334-2340.
Toll free phone: 8002490000
E-mail: npc.drug@sfda.gov.sa
Website: www.sfda.gov.sa/npc

5. How to store Gyno-Mikozal

- Keep out of the reach and sight of children.
- Store below 30°C. Best use within one month of opening.
- Do not use **Gyno-Mikozal** after the expiry date which is stated on the carton and on the tube.
- Do not use **Gyno-Mikozal** if you notice any visible sign of deterioration.
- Medicines should not be disposed off via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose off medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. Further information

What Gyno-Mikozal contains
The active substance is Miconazole Nitrate. Each 1 gram of the cream contains: Miconazole Nitrate 20mg.
Other ingredients: Glycol and polyglycol stearate, polyoxyethylenated oleic glycerides, liquid paraffin, butylated hydroxyanisole, benzoic acid, and purified water.
What is the available pack of Gyno-Mikozal
Gyno-Mikozal cream is available in collapsible tubes of 78g of the cream with an applicator.

THIS IS A MEDICAMENT

- Medicament is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicines their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of the children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists

Any information? Call* (971) 800-4994, *U.A.E.

Produced by: julphar
Gulf Pharmaceutical Industries,
Ras Al Khaimah, U. A. E.

21/04/2016

معلومات لمستخدم الدواء

جاينو - ميكوزال

كريم مهبلي ٢٪ **٢٠ ملغم**
مضاد للفطريات **نترات الميكونازول**

يرجى منك قراءة هذه النشرة جيداً قبل استعمال هذا الدواء، حيث أنها تحتوي على معلومات هامة لك.
- احتفظ بهذه النشرة، فربما تحتاجين إلى قراءتها مرة ثانية.
- في حال كان لديك أية أسئلة تتعلق بهذا المستحضر يرجى منك استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه.
- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناء على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.
- يرجى منك الاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

١. ما هو **جاينو-ميكوزال**، وما هي استعمالاته
٢. ما عليك معرفته قبل استعمال **جاينو-ميكوزال**
٣. طريقة استعمال **جاينو-ميكوزال**
٤. التأثيرات الجانبية المحتمل حدوثها
٥. ظروف تخزين **جاينو-ميكوزال**
٦. معلومات إضافية

١. ما هو جاينو - ميكوزال، وما هي استعمالاته

يعرف هذا الدواء باسم كريم **جاينو- ميكوزال**.
يستخدم كريم **جاينو- ميكوزال** للمرضى البالغين.
يحتوي كريم **جاينو- ميكوزال** على المادة الدوائية نترات الميكونازول. والتي تنتمي إلى مجموعة من الأدوية تعرف باسم «مضادات الفطريات».
يستعمل كريم **جاينو- ميكوزال** لحالات العدوى التي تصيب المهبل ومنطقة الجلد حول المهبل وتتضمن أعراض العدوى على الحكة، الاحمرار ووجود إفرازات بيضاء اللون.
يعمل كريم **جاينو - ميكوزال** عن طريق القضاء على الفطريات المسببة للعدوى وبعض سلالات البكتيريا التي قد تكون أيضاً متواجدة.
قد يحتاج شريك حياتك أيضاً للخضوع للعلاج. يرجى منك استشارة طبيبك المعالج للحصول على النصيحة حول هذا الأمر.

معلومات حول داء القلاع المهبلي
يعد داء القلاع المهبلي من إحدى المشكلات الشائعة جداً التي تؤثر على النساء من جميع الأعمار. ولا يعتمد حدوثه فقط على عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية .
حيث أنه غالباً ما يحدث بسبب أحد أنواع الفطريات (كانديدا البيكانز) والتي تتواجد لدى جميع الأشخاص. وعادة ما يتم القضاء عليها بواسطة الوسائل الدفاعية في الجسم.
في بعض الأحيان قد تصبح هذه الفطريات مصدراً للمشاكل نتيجة للأسباب التالية:
- استعمال المضادات الحيوية
- الحمل
- استعمال موانع الحمل الفموية
- ارتداء الملابس الضيقة
- الاستعمال المفرط للحمامات الساخنة والمواد المضافة أثناء الإستحمام.

يمكن منع معاودة حدوث العدوى عن طريق:
- غسل المنطقة المصابة صباحاً ومساءً بالماء الدافئ. من المهم جداً أن تجفف المنطقة تماماً.
- الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بالمهبل بعد كل زيارة للمرحاض.
- عدم استخدام أية اضافات دوائية أو عطرية أثناء الحمام
- عدم ارتداء الملابس الضيقة

٢. ما عليك معرفته قبل استعمال جاينو-ميكوزال

يجب عدم استعمال جاينو-ميكوزال في الحالات التالية:
- إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي من مكونات كريم **جاينو- ميكوزال** (المدرجة في البند رقم ٦).

يجب عدم استعمال هذا الدواء إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك. إذا كان لديك أدنى شك بذلك، يرجى منك التحدث إلى طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه قبل استعمال كريم **جاينو - ميكوزال**.

تحذيرات واحتياطات
استشيري طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه قبل استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:
- استخدام الواقي كأحد طرق منع الحمل والتي تشتمل على الواقي الذكري والأغشية الحاجزة.

حيث أن كريم **جاينو- ميكوزال** قد يلحق الضرر بالمادة المطاطية المصنوع منها مثل هذه الوسائل وتمنع عملها على الوجه الصحيح. يرجى منك التحدث إلى طبيبك المعالج حول امكانية استخدام أحد الأنواع الأخرى من وسائل منع الحمل أثناء فترة استعمال هذا الدواء.
- يجب عليك عدم مشاركةالسماح لأشخاص آخرين باستعمال ملابسك أو المنشفة الخاصة بك. وذلك لمنع انتقال العدوى منك للآخرين.

الأطفال والمراهقين
يوصى بعدم استعمال كريم **جاينو- ميكوزال** من قبل الأطفال أو المراهقين بعمر أقل من ١٨سنة.

تناول الأدوية الأخرى
يرجى منك إخبار طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه إذا كنت تتناولين أو تناولت مؤخراً أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية أو الأدوية العشبية.
يجب عليك إخبار طبيبك المعالج على وجه الخصوص إذا كنت تتناولين أحد الأدوية التالية:
- الأدوية التي تعمل على تمييع الدم (مضادات التخثر) بالمثل الوارفارين. قد يحتاج طبيبك المعالج إلى التأكد من أن مضادات التخثر التي تتناولينها تعمل بشكل صحيح على الوجه المطلوب.
- أدوية داء السكري، التي يتم تناولها عن طريق الفم.
- الأدوية التي تعمل على القلب والأوعية الدموية تعرف باسم «حاصرات قنوات الكالسيوم» بالمثل ثنائي هيدرات البيريدين وفيرابامبل.
- دواء لحالات الصرع مثل فينيتوين
- أدوية لخفض مستويات الكولسترول تعرف باسم لوفاستاتين أو سيمفاستاتين.

يرجى منك إخبار طبيبك المعالج قبل تناول، أو إذا كنت تتناولين بالفعل أي مما ذكر أعلاه. فقد تكون بحاجة إلى تغيير العلاج.

الحمل والرضاعة الطبيعية
يرجى منك التحدث إلى طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه قبل استعمال كريم **جاينو- ميكوزال**، إذا كنت حاملاً، تعتقدين أنك حاملاً أو تخططين للحمل.
قد يكون لا يزال بامكانك استعمال كريم **جاينو- ميكوزال** في حال اعتقد طبيبك المعالج أنك بحاجة لاستعماله.
يرجى منك التحدث إلى طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه قبل استعمال هذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية.
يجب عليك استشارة طبيبك المعالج قبل استعمال أي دواء، إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلك رضاعة طبيعية.

معلومات هامة عن بعض مكونات كريم جاينو- ميكوزال
- يحتوي الكريم على حمض البنزويك وهيدروكسي أنيسول البيوتيلي . قد تسبب هذه المواد تهيجاً للبشرة، العينين، الجفون، الفم، وفتحات الأنف في حال لامست هذه المناطق.

٣. طريقة استعمال جاينو- ميكوزال

يجب استعمال هذا الدواء دائماً بدقة وفقاً لتعليمات طبيبك المعالج. كما يجب عليك استشارة طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه ما لم تكوني متأكدة من طريقة الاستعمال.

استعمال الكريم
- إن كل أنبوب من كريم **جاينو-ميكوزال** مغلفة بإحكام. لذا فإنك بحاجة إلى الطرف المدبب من الغطاء لثقب الأنبوبة.
- يجب عدم ابتلاع الكريم.

لحالات العدوى التي تصيب المهبل
قد يقترح عليك طبيبك المعالج إلى الخضوع للعلاج على مدى ٧ أيام إلى ١٤ يوماً.
- **٧أيام من العلاج.** ضعي الكريم في المهبل مرتين يومياً لمدة ٧ أيام.
- **١٠أيام إلى ١٤ يوماً.** ضعي الكريم في المهبل مرتين يومياً لمدة ١٠ إلى ١٤ يوماً.

سوف يخبرك طبيبك المعالج بكمية الكريم الواجب عليك استعمالها وبمدة العلاج.

حالات العدوى خارج المهبل
- قومي بوضع الكريم على المنطقة المصابة مرتين يومياً.
- قومي بوضع طبقة رقيقة من الكريم حول المنطقة المحيطة بالمهبل
- اغسلي يديك دائماً بالماء والصابون بعد استعمال الكريم.

متى يمكنك التوقف عن استعمال كريم جاينو-ميكوزال
استمري في استعمال الكريم حتى يتم الإنتهاء من الدورة العلاجية المحددة لك، حتى أثناء فترة الدورة الشهرية. استمري في استعمال الدواء حتى وإن اختفت الأعراض مثل الإحمرار، الحكة و الإفرازت، قبل إنتهاء فترة العلاج المحددة لك.

إرشادات الاستعمال
- اغسلي يديك جيداً.
- ارفعي غطاء الأنبوبة التي تحتوي على الدواء ثم اثقبي السدادة بواسطة الدبوس الموجود في أعلى الغطاء.
- قومي بتثبيت المحقان على فوهة الأنبوبة.
- اضغطي الأنبوبة حتى يمتلئ المحقان كلياً بالكريم أو حتى يمتلئ بالكمية التي أوصى بها الطبيب المعالج.
- افصلي المحقان عن الأنبوبة واغلقي الأنبوبة فوراً بشكل جيد.
- استلقي على ظهرك مع رفع الفخذين وثني الركبتين وإبعادهما عن بعضهما.
- ادخلي المحقان برفق عميقاً داخل المهبل، أمسكي أسطوانة المحقان بيد واضغطي على المكبس باليد الأخرى حتى يصل الدواء إلى داخل المهبل.
- اسحبي المحقان من المهبل.

إرشادات تنظيف المحقان
- قومي بتنظيف المحقان وذلك بفصل جزئيه و غسلهما بالماء الدافئ والصابون، ثم اشطفيه جيداً وجففيه.
- أعيدي تركيب قطعتي المحقان بعد جفافهما واحفظي المحقان في حافظة نظيفة.
- يجب تعقيم المحقان إذا أوصى الطبيب المعالج بذلك. لا تستعملي الماء الذي تزيد درجة حرارته عن ٥٥٠م، ولا تستعملي الإيثر أيضاً.

إذا ابتلعتي كريم جاينو-ميكوزال على سبيل الخطأ
في حال ابتلاع على سبيل الخطأ كمية كبيرة من الكريم، اخبري طبيبك المعالج أو توجهي على الفور إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى إليك.

إذا سهوتي عن وضع جرعة
- لا تقلقي، وقومي بوضع الجرعة التالية في وقتها المعتاد واستمري في استعمال الكريم كما أخبرك طبيبك المعالج.
- لا تضعي جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات المفردة التي قد سهوتي عن وضعها.

إذا كان لديك المزيد من الاستفسارات التي تخص استعمال هذا المستحضر، يرجى منك الاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه.

٤. التأثيرات الجانبية المحتمل حدوثها

شأنه شأن جميع الأدوية، قد يؤدي كريم **جاينو- ميكوزال** إلى حدوث تأثيرات جانبية، ولكن قد لا تحدث لكل شخص.
توقفي عن استعمال كريم جاينو-ميكوزال واخبري طبيبك المعالج على الفور في حال لاحظتي حدوث ما يلي فقد تكوني بحاجة للخضوع إلى معالجة طبية.
- تهيج شديد أو احمرار الجلد، تورم في الوجه، الشفتين، اللسان أو الحلق، دوار، أزيز أو صعوبة في التنفس أو غيرها من علامات الحساسية الأخرى خلال الأيام القليلة الأولى من العلاج. يحدث هذا فقط لعدد قليل من الأشخاص.

تأثيرات جانبية أخرى:
- تهيج موضعي (حول أو داخل المهبل)، حكة أو شعور بالحرقة في المنطقة المعالجة. يعد ذلك أخف بكثير من رد الفعل التحسسي. أخبري طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه إذا استمرت هذه الأعراض.
- طفح جلدي أو طفح على شكل خلايا النحل (المعروف أيضا باسم القراص أو الشرى)
- ألم في المعدة
- الام أسفل المعدة (تقلصات في منطقة الحوض)
- صداع
- عدوى في المسالك البولية أو ألم أثناء التبول
- نزيف مهبلي
- الشعور بالإعياء (الغثيان)
- احمرار الوجه

في حال تعرضك لحدوث أية تأثيرات جانبية بما في ذلك التي لم يتم ذكرها في هذه النشرة، يرجى منك إخبار طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه.

للإبلاغ عن حدوث أية تأثيرات جانبية:
المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية
رقم الفاكس: ٧٦٦٢-٢٠٥-١١-٩٦٦+
يرجى الاتصال بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية على: ٢٠٣٨٢٢٢-١١-٩٦٦+
تحويلة هاتف: ٢٣٤٠-٢٣٣٤-٢٣٥٤-٢٣٥٣-٢٣٥٦-٢٣١٧
الهاتف المجاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
الموقع الإلكتروني: www.sfda.gov.sa/npc

٥. ظروف تخزين جاينو-ميكوزال

- يحفظ بعيداً عن متناول ومرأى الأطفال.
- يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠م. يفضل استعماله خلال شهر واحد من الفتح.
- يجب عدم استعمال **جاينو- ميكوزال** بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على العبوة والأنبوب.
- يجب عدم استعمال **جاينو- ميكوزال** إذا لاحظت وجود علامات تلف واضحة.
- يجب عدم التخلص من الأدوية عبر المياه المبتذلة (مياه الصرف الصحي) أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي الذي تتعاملين معه عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

٦. معلومات إضافية

ماهي محتويات جاينو-ميكوزال
المادة الفعالة هي نترات الميكونازول. يحتوي كل ١ غرام من الكريم على نترات الميكونازول ٢٠ ملغم.
المواد الأخرى: استيارات الجلايكول والبولي جلايكول، جليسيريدات حمض الأوليك البولي أوكسي اثيلني، بارافين سائل، هيدروكسي أنيسول البيوتيلي، حمض البنزويك وماء منقى.
ما هي العبوات المتوفرة من جاينو-ميكوزال
يتوفر **جاينو - ميكوزال** في أنابيب تحتوي على ٧٨ غرام من الكريم مع محقان.

إن هذا الدواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب

للاستفسار: الرجاء الاتصال بالرقم ٨٠٠-٤٩٩٤ (٩٧١)، إ. ع. م.

إنتاج: جلفار
الخليج للصناعات الدوائية،
رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.

٢٠١٦/٤/٢١م

N312534A_Gyno-Mikozal Cream.indd 2
6/5/2018 11:04:34 AM