

Package Leaflet: Information for the User

Diphenhydramine hydrochloride 14mg/5ml/ Ammonium Chloride 135mg/5ml/ Menthol 1.1mg/5ml – 100 ml Syrup



What is in this leaflet

1. What Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol is and what it is used for
2. What you need to know before you take Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol
3. How to take Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol
4. Possible side effects
5. How to store Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol

1. What is Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol and what is used for

Diphenhydramine Hydrochloride/ Ammonium Chloride / Menthol is a medicine that is used for cough relief and is also a decongestant. Diphenhydramine Hydrochloride works by inhibiting the histamine-1 receptor sites, therefore temporarily causing pain relief and decreasing cough. Ammonium Chloride also acts as a decongestant and helps in reducing the viscosity of mucus. Menthol has a local analgesic effect which helps reduce the cough. This medicine is therefore used for the relief of cough and congestion during cold or allergies.

2. What you need to know before you take Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol

Do not take Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol

- If you are allergic to Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol, or any of the ingredients in this medicine. Tell your doctor about the allergy and what signs you had.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you have taken a MAO inhibitor within the last 2 weeks.



Warnings and precautions

- Stop the medication right away and talk to your doctor or pharmacist if you develop allergic reactions such as shortness of breath, skin rash, swelling of the face or neck, decreased blood pressure and dizziness.
- Talk to your doctor before starting this medicine if you have any of the following health problems; asthma or other chronic respiratory problems, glaucoma (increased eye pressure), benign prostatic hyperplasia, difficulty urinating or liver problems.
- Concomitant intake of alcohol with this medicine may increase side effects like drowsiness and dizziness, therefore, make sure that you avoid drinking alcohol with this medicine.



Other medicines and Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medications including prescription medicines, over the counter medicines, herbals, vitamins and supplements.

- If you are taking or have recently taken MAO inhibitors within the last 2 weeks.
- If you are taking antiepileptics (e.g. carbamazepine) used to treat convulsions.
- If you are taking TCAs (type of medicines mainly used to treat depression).
- If you are taking anxiolytics or sedatives (e.g. benzodiazepines).

Talk to your healthcare provider if you are not sure if the medicine you are taking is listed above. Keep a list of the medicines that you take and take it with you during your visits to your healthcare provider. Make sure that you do not start new medicines without talking to your healthcare provider first.



Pregnancy and breastfeeding

Talk to your doctor if you are pregnant, plan on getting pregnant or breastfeeding. Do not take this medicine if you are pregnant or breastfeeding.

Driving and using machines

This medicine may cause side effects that may affect your ability to drive or use machines like drowsiness and dizziness. Do not drive or use machines when taking this medicine until you know how this medicine affects you.



3. How to take Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol

Adults

Take 5 – 10 ml 4 times daily.

Children 1-6 years

Recommended dose is 2.5 ml 4 times daily.

Children 6-12 years

Recommended dose is 5 ml 4 times daily.

- Take your medication exactly as prescribed by your doctor.
- This medicine is intended for oral use only.

If you take more Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol than you should

If you take more Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol than you should, make sure that you contact your healthcare provider.

If you forget to take Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol

If you miss a dose, take your missed dose as soon as you remember. If it is already close to the next dose, skip the missed dose and continue with your usual routine. Do not double the dose.

If you stop taking Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol

Talk to your doctor for advice on when to stop taking this medicine.



4. Possible side effects

Although it may be rare, some patients may experience undesirable side effects when taking a medication. Contact your healthcare provider if you experience any side effect. Tell your doctor or get medical help right away if you experience any of the following signs of an allergic reaction (rare), like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin with or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat.

Common side effects

- Drowsiness
- Dizziness
- Headache
- Dry mouth
- Difficulty urinating



5. How to store Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol

- Keep out of the reach of children and pets
- Store Diphenhydramine hydrochloride/ Ammonium Chloride/ Menthol at or below 25°C.
- Do not use beyond the expiry date mentioned on the box
- Keep medication in its original container (tightly closed) to protect it from moisture and light
- Do not dispose medication in the wastewater or household waste

Contact with Saudi Food Drugs Authority

Call Center 19999

Phone 0118806000-0112038222

Free Phone 8002490000

Email: webmaster@sfda.gov.sa

Postal address

Saudi Food & Drugs Authority

(3292) North Road – Al Nafal

Unit (1)

Riyadh 13312 – 6288

Saudi Arabia

النشرة الدوائية، معلومات للمريض

شراب ديفينهيدرامين هيدروكلوريد 14 مجم/5 مل/ كلوريد الأمونيوم 135 مجم/5 مل/ مينثول 1.1 مجم/5 مل - 100 مل

ماذا في هذه النشرة؟



1. ما هو ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول وما هو إستخدامه
2. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول
3. كيف تأخذ ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول

1. ما هو ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول وما هو إستخدامه

ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ المنثول هو دواء يستخدم لتخفيف السعال وهو أيضًا مزيل للاحتقان. يعمل ديفينهيدرامين هيدروكلوريد عن طريق تثبيط مواقع مستقبلات الهيستامين 1، وبالتالي يسبب مؤقتًا تخفيف الالام وتقليل السعال. يعمل كلوريد الأمونيوم أيضًا كمزيل للاحتقان ويساعد في تقليل لزوجة المخاط. للمنثول تأثير مسكن موضعي يساعد في تقليل السعال. لذلك يستخدم هذا الدواء للتخفيف من السعال والاحتقان أثناء البرد أو الحساسية.

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول

لا تتناول ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول أو أي من مكونات هذا الدواء. أخبر طبيبك عن الحساسية والعلامات التي لديك.
- إذا كنت حاملًا أو مرضعة.
- إذا كنت قد تناولت مثبط MAO خلال الأسبوعين الماضيين.

لا تعط هذا الدواء للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

المحاذير والاحتياطات



- توقف عن تناول الدواء على الفور وتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا ظهرت عليك ردود فعل تحسسية مثل ضيق التنفس والطفح الجلدي وتورم الوجه أو الرقبة وانخفاض ضغط الدم والدوخة.
- تحدث إلى طبيبك قبل البدء في هذا الدواء إذا كان لديك أي من المشاكل الصحية التالية؛ الربو أو مشاكل الجهاز التنفسي المزمنة الأخرى، الجلوكوما (زيادة ضغط العين)، تضخم البروستاتا الحميد، صعوبة التبول أو مشاكل الكبد.
- قد يؤدي تناول الكحول مع هذا الدواء إلى زيادة الآثار الجانبية مثل النعاس والدوخة، لذلك تأكد من تجنب شرب الكحول مع هذا الدواء.



الأدوية الأخرى وديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية الموصوفة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأعشاب والفيتامينات والمكملات.

- إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا مثبطات MAO خلال الأسبوعين الماضيين.
- إذا كنت تتناول مضادات الصرع (مثل كاربامازيبين) المستخدمة لعلاج التشنجات.
- إذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (نوع من الأدوية المستخدمة أساسًا لعلاج الاكتئاب).
- إذا كنت تتناول مزيلات القلق أو المهدئات (مثل البنزوديازيبينات).

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الدواء الذي تتناوله مدرجًا أعلاه. احتفظ بقائمة بالأدوية التي تتناولها وخذها معك أثناء زيارتك لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك. تأكد من أنك لا تبدأ أدوية جديدة دون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً.



الحمل والرضاعة

تحدث إلى طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. لا تتناولين هذا الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

القيادة واستخدام الآلات

قد يتسبب هذا الدواء في آثار جانبية قد تؤثر على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات مثل النعاس والدوخة. لا تقود السيارة أو تستخدم الآلات عند تناول هذا الدواء حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء عليك.



3. كيف تتناول ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول

الكبار

خذ 5 - 10 مل 4 مرات يومياً.

الأطفال 1-6 سنوات

الجرعة الموصى بها 2.5 مل 4 مرات يومياً.

الأطفال 6-12 سنة

الجرعة الموصى بها 5 مل 4 مرات يومياً.

- تناول دوائك تمامًا كما وصفه طبيبك.
- هذا الدواء مخصص للاستخدام الفموي فقط.

إذا تناولت ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول أكثر مما يجب

إذا تناولت هيدروكلوريد ديفينهيدرامين أكثر مما يجب، فتأكد من الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

إذا نسيت تناول ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول

إذا فاتتك جرعة، خذ جرعتك المنسية بمجرد أن تتذكرها. إذا كانت قريبة بالفعل من الجرعة التالية، فتجاوز الجرعة الفائتة واستمر في روتينك المعتاد. لا تضاعف الجرعة.

إذا توقفت عن تناول ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول

تحدث إلى طبيبك للحصول على المشورة بشأن موعد التوقف عن تناول هذا الدواء.

4. الآثار الجانبية المحتملة



على الرغم من أنه قد يكون نادرًا، قد يعاني بعض المرضى من آثار جانبية غير مرغوب فيها عند تناول الدواء. اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا واجهت أي آثار جانبية. أخبر طبيبك أو احصل على مساعدة طبية على الفور إذا واجهت أيًا من العلامات أو الأعراض التالية: علامات رد فعل تحسسي، مثل الطفح الجلدي، قشعريرة؛ حكة؛ جلد أحمر أو منتفخ أو متقشر أو مقشر مع أو بدون حمى؛ أزيز، ضيق في الصدر أو الحلق، صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث؛ بحة غير عادية أو انتفاخ الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

الآثار الجانبية الشائعة

- النعاس
- دوخة
- صداع الراس
- فم جاف
- صعوبة التبول

5. كيفية تخزين ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول



- احفظ الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- قم بتخزين ديفينهيدرامين هيدروكلوريد/ كلوريد الأمونيوم/ مينثول عند أو أقل من 25 درجة مئوية.
- لا تستخدم الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور في العلبة.
- احتفظ بالدواء في عبوته الأصلية (مغلقة بإحكام) لحمايته من الرطوبة والضوء.
- لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية.

للإتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء

الرقم الموحد 19999

هاتف رقم 0112038222 - 0118806000

الهاتف المجاني 8002490000

البريد الإلكتروني: webmaster@sFDA.gov.sa

العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء

(3292) الطريق الدائري الشمالي - حي النفال

الوحدة رقم 1

الرياض 13312 - 6288

المملكة العربية السعودية