

Prosmetto™ Softgel Capsules

Saw Palmetto 320 mg

Read this entire leaflet carefully before you start taking Prosmetto™ Softgel Capsules.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your pharmacist or physician.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your pharmacist or physician.

In this leaflet:

1. What Prosmetto™ is and what it is used for
2. Before you take Prosmetto™
3. How to take Prosmetto™
4. Possible side effects
5. How to store Prosmetto™
6. Further information.

1. What Prosmetto™ is and what it is used for

Prosmetto™ is a dietary supplement containing Saw Palmetto (standardized to contain 80% fatty acids).

Prosmetto™ Helps in relieve prostate enlargement.

2. Before you take Prosmetto™

Do not take Prosmetto™

If you are allergic (hypersensitive) to any of the active substances or any of the other ingredients of Prosmetto™.

When to exercise particular caution while taking Prosmetto™:

Prosmetto™ relieves complaints related to prostate gland hypertrophy without subsiding it, and hence, it does not cure the disease.

You should regularly consult your doctor. In particular, medical advice is necessary in finding blood in urine and in retention of urine in the bladder.

Taking other medicines

Talk to your doctor, pharmacist, or health care provider if you are taking any other medications.

Pregnancy and breast-feeding

Not applicable as Prosmetto™ is used only in men.

Driving and using machines

Taking Prosmetto™ does not affect ability to drive vehicles and operate machines.

3. How to take Prosmetto™

Take Prosmetto™ exactly as directed in this leaflet. You should check with your pharmacist or physician if you are not sure.

As a dietary supplement, adults should take one capsule per day. The capsules should be swallowed whole with adequate volume of liquid. It is particularly important that Prosmetto™ should be taken regularly to ensure efficacy of treatment.

Duration of therapy:

Duration of therapy depends only on the nature, intensity and the course of your disease. Duration of therapy shall be determined by your doctor, according to results of regular control tests. Most commonly, improvement of patient's condition and relieve of symptoms is observed after about 4 weeks since the beginning of treatment.

If your symptoms do not subside or even aggravate, please contact your doctor.

If you take more Prosmetto™ than you should

Do not exceed recommended dosage of Prosmetto™, in case of any adverse action seek medical help.

If you forget to take Prosmetto™

Do not take extra dose to make up the missed dose.

4. Possible side effects

Like all medicines, Prosmetto™ can cause adverse reactions, although not all patients experience them. If any of the adverse reactions gets serious or if you experience any adverse reaction not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist. Gastric disorders may occur in rare cases.

5. How to store Prosmetto™

Keep out of reach and sight of children.

Do not store above 30 °C.

Protect from heat and moisture.

Do not freeze.

6. Further information

What Prosmetto™ contains

Each Softgel capsule contains saw palmetto 320 mg (Standardized to contain 80 % of fatty acids) Other ingredients are: Gelatin, Glycerol, Brilliant Blue FDC #1 and Purified Water.

What Prosmetto™ looks like and contents of the pack

Prosmetto™ is Oval shaped, black colored soft gelatin capsules containing yellowish brown or orange brown oily liquid with a strong odour but not rancid.

Prosmetto™ available in the following packs:

Prosmetto™ 60 Softgel capsules packed in HDPE bottle.

Prosmetto™ 30 Softgel capsules packed in 3 blisters.

Not all packs may be marketed.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

Jamjoom Pharmaceuticals Co.,

Jeddah, Makkah region,

Saudi Arabia.

Tel: +966-12-6081111.

Fax: +966-12-6081222.

Website: www.jamjoompharma.com

To report any side effect(s):

• Saudi Arabia:

The National Pharmacovigilance and Drug Safety Centre (NPC)

o Fax: +966-11-205-7662

o Call NPC at +966-11-2038222,

Ext: 2317-2356-2340.

o Reporting hotline: 19999

o E-mail: npc.drug@sfd.gov.sa

o Website: www.sfd.gov.sa/npc

• Other GCC States:

– Please contact the relevant competent authority.

This leaflet was last reviewed at 06/2019;

Version number 01.

Prosmetto™ is a product manufactured by:

JP Nutraceuticals, a division of



P.O.Box 6267 Jeddah - 21442- Saudi Arabia

12503454- Rev. 01/18-06-19

1968

1968

بروسميتو™ كبسولات جيلاتينية لينة ساو بالميتو ٣٢٠ ملجم

٤. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يتسبب بروسميتو™ في حدوث ردود فعل سلبية ، على الرغم من عدم تعرض جميع المرضى لها. إذا كان أي من التفاعلات الضارة جدياً أو إذا واجهت أي رد فعل سلبي غير مدرج في هذه النشرة ، يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي. قد تحدث اضطرابات معدية في حالات نادرة.

٥. كيفية تخزين بروسميتو™

يحفظ بعيداً عن متناول و مرأى الأطفال.
يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.
يحفظ بعيداً عن الحرارة والرطوبة.
لا يجمد.

٦. معلومات إضافية

ما هي مكونات بروسميتو™

كل كبسولة جيلاتينية لينة تحتوي على ٣٢٠ ملجم من ساو بالميتو (موجد لإحتواء على ٨٠٪ من الأحماض الدهنية). المكونات الأخرى هي: جيلاتين، جليسرول، لون أزرق لامع FDC#١ و ماء منقى.

ما شكل بروسميتو™ وما هي محتويات العبوة

بروسميتو™ هو كبسولات جيلاتينية لينة لونها أسود بيضاوية الشكل ، تحتوي على سائل زيتي بني مائل للأصفر أو البرتقالي مع رائحة قوية ولكنها ليس بها أي زناخة بروسميتو™ متوفر في العبوات التالية:
بروسميتو™ ٦٠ كبسولة جيلاتينية لينة معبأة في عبوة من البولي إيثيلين عالي الكثافة.
بروسميتو™ ٣٠ كبسولة جيلاتينية لينة معبأة في عبوة بها ٣ شرائط.

قد لا تكون كل العبوات مسوقة.

إسم وعنوان مالك رخصة التسويق و المصنع:

شركة مصنع مجوم للأدوية،

جدة، منطقة مكة،

المملكة العربية السعودية.

الهاتف: +٩٦٦-١٢-٦٠٨١١١١

فاكس: +٩٦٦-١٢-٦٠٨١٢٢٢

الموقع الإلكتروني: www.jamjoompharma.com

للإبلاغ عن أي آثار جانبية:

• المملكة العربية السعودية:

- المركز الوطني للتبليغ و السلامة الدوائية

o فاكس: +٩٦٦-١١-٢٥٠٧٦٦٢

o للإتصال بالإدارة التنفيذية للتبليغ وإدارة الأزمات.

o هاتف: +٩٦٦-١١-٢٠٣٨٢٢٢

o تحويلة: +٩٦٦-١١-٢٠٣٨٢٢٢

o الخط الساخن للإبلاغ: ١٩٩٩٩

o بريد إلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

o الموقع الإلكتروني: www.sfd.gov.sa/npc

• دول الخليج الأخرى:

الرجاء الاتصال بالمؤسسات و الهيئات الوطنية في كل دولة.

تم مراجعة هذه النشرة في ٢٠١٩ / ٠٦ رقم النسخة ٠١

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول كبسولات بروسميتو™

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، اسأل الصيدلي أو الطبيب.
- إذا كان أي من الآثار الجانبية جدية، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إخبار الصيدلي أو الطبيب

في هذه النشرة:

١. ما هو بروسميتو™ وماهي إستخداماته

٢. قبل أن تأخذ بروسميتو™

٣. كيفية أخذ بروسميتو™

٤. الآثار الجانبية المحتملة

٥. كيفية تخزين بروسميتو™

٦. معلومات إضافية

١. ما هو بروسميتو™ و ماهي إستخداماته

بروسميتو™ هو مكمل غذائي يحتوي على مستخلص ساو بالميتو (موجد لإحتواء ٨٠٪ من الأحماض الدهنية).

بروسميتو™ يساعد في التخفيف من تضخم البروستات.

٢. قبل إستخدام بروسميتو™

لا تأخذ بروسميتو™

إذا كنت مصاباً بحساسية لأي من المواد الفعالة أو غيرها من مكونات بروسميتو™.

متى يجب توخي الحذر عند أخذ بروسميتو™:

بروسميتو™ يُخفف من الشكاوى المتعلقة بتضخم الغدة البروستاتية بدون إخمادها، وبالتالي لا يعالج المرض.

يجب عليك استشارة طبيبك بانتظام. على وجه الخصوص، في حالة العثور على الدم في البول وحالات إحتباس البول في المثانة.

الإستعمال مع الأدوية الأخرى

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تتناول أية أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة

لا يُستخدم بروسميتو™ للسيدات وإنما هو منتج للرجال فقط.

التأثير على القيادة و إستخدام الآلات

لا يؤثر بروسميتو™ على القدرة على قيادة المركبات وتشغيل الآلات.

٣. كيفية استخدام بروسميتو™

تناول بروسميتو™ تماماً كما هو موضح في هذه النشرة. يجب عليك مراجعة الصيدلي أو الطبيب إذا لم تكن متأكد.

كمكمل غذائي يأخذ الكبار كبسولة واحدة يومياً ، يجب بلع الكبسولة كاملة مع كمية كافية من السائل. من المهم بشكل خاص أن يتم تناول بروسميتو™ بانتظام لضمان فعالية العلاج.

مدة العلاج:

مدة العلاج تعتمد فقط على طبيعة وشدة ومسار مرضك.

تُحدد مدة العلاج من قبل الطبيب ، وفقاً لنتائج اختبارات المتابعة العادية. و الأكثر شيوعاً ، أنه قد لوحظ تحسن حالة المريض وتخفيف الأعراض بعد حوالي ٤ أسابيع منذ بداية العلاج. إذا كانت أعراضك لا تهدأ أو حتى تتفاقم ، يرجى الاتصال بالطبيب.

إذا تناولت بروسميتو™ أكثر مما ينبغي

لا تتخطى الجرعة المحددة من بروسميتو™ ، وقم بالإستعانة بالدعم الطبي في حالة حدوث أي أعراض جانبية.

إذا نسيت أخذ جرعة بروسميتو™

لا تأخذ جرعة إضافية لتعويض الجرعة الفائتة .

بروسميتو™ ، مستحضر من إنتاج :

JP Nutraceuticals, a division of

مجوم فارما
Jamjoom Pharma

JP Nutraceuticals
For a Quality Life

ص.ب : ٦٦٦٧ - جدة ٢١٤٤٢ - المملكة العربية السعودية

12503454- Rev. 01/18-06-19